



## Anmeldung

Die Anmeldung befindet sich im Bereich der kardiologischen Ambulanzen, zu erreichen über den Eingang Haus S (Wegbeschreibung: siehe Plan rechts).

## Ihr Termin

## Bitte bringen Sie mit

- Einweisungsschein
- Versichertenkarte
- Personalausweis
- Unterlagen / Vorbefunde
- EKG, wenn vorhanden
- Aktuelle Blutwerte

## Information

Sekretariat Herzkatheter  
Herr M. Gries, Frau A. Kukla-Seelbinder  
Tel. 040 181885-2033

## Notfälle

Notfälle jederzeit (24h)  
Zentrale Notaufnahme (ZNA)  
Haus E  
Tel. 040 181885-2036  
Fax 040 181885-3990

## Zertifikate ■ Auszeichnungen



## Kontakt

### Asklepios Klinik St. Georg

Kardiologie  
Lohmühlenstr. 5 · 20099 Hamburg  
Leitender Arzt Prof. Dr. Stephan Willems  
Sekretariat Herzkatheter  
Herr M. Gries, Frau A. Kukla-Seelbinder  
Tel. 040 181885-2033  
Fax 040 181885-3869  
Sekretariat.HKL.stgeorg@asklepios.com  
www.asklepios.com/sanktgeorg

## Der Weg zu uns



## Kardiologie

## Verschluss von

- persistierendem Foramen ovale
- Vorhofseptumdefekt

## Informationen für Patienten



Prof. Dr. med.  
Stephan Willems


## Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Sie haben sich gemeinsam mit uns und Ihrem Arzt dazu entschlossen, dass ein Verschluss von Verbindungen zwischen linkem und rechtem Vorhof des Herzens – des Foramen ovale oder eines anderen Vorhofseptumdefekts – notwendig ist. Wir führen diesen Eingriff mit guten Erfahrungen seit mehr als 15 Jahren durch. Er kommt vor allem für die Patienten in Frage, die bereits einen Schlaganfall hatten.

## Aufnahme

Am Vortag des Eingriffs führen wir mit Ihnen ein ausführliches Arztgespräch und verschiedene Untersuchungen durch, die der Sicherheit des Eingriffs und der Bestätigung der Diagnose dienen.

Da wir gemeinsam mit anderen Zentren klinische Studien über die Langzeiteffekte der Methode durchführen, werden wir Sie am Aufnahmetag um Erlaubnis bitten, in regelmäßigen Abständen nach dem Eingriff kurz mit Ihnen Kontakt aufzunehmen.



## Eingriff

Am Tag des Eingriffs dürfen Sie morgens noch etwas trinken, aber nichts mehr essen. Während des Eingriffs im Herzkatheterlabor schlafen Sie, da wir währenddessen eine Ultraschalluntersuchung über die Speiseröhre zur genauen Steuerung durchführen. Ein Katheter wird über die Leistenvene eingeführt und bis ins Herz und über die Verbindung in die linke Vorkammer gebracht. Über diesen Katheter wird ein Schirm (Doppelschirm) linksseitig, der andere Schirm rechtsseitig an der Scheidewand entfaltet.

## Nach dem Eingriff

Nach der Untersuchung wird die Zugangsstelle sofort wieder verschlossen.

Während der Doppelschirm einwächst, benötigen Sie für 3 Monate eine Therapie mit ASS und Clopidogrel.

Drei Monate nach dem Eingriff führen wir in der Regel eine ambulante Kontrolle des Ergebnisses mit einer Schluckultraschall-Untersuchung durch.



## Wichtige Fragen & Informationen

- Besteht eine Medikamenten-, Kontrastmittel- oder Jod-Allergie?
- Ist eine Nierenfunktionsstörung bekannt?
- Liegt eine Störung der Schilddrüse vor?
- Nehmen Sie Marcumar?  
Der Quickwert muss mindestens 35% betragen, bzw. der INR sollte zwischen 2 und 3 liegen – es kann sonst zu vermehrten Blutungen kommen.
- Nehmen Sie Rivaroxaban (Xarelto®, Pradaxa® oder Eliquis®)?  
Nehmen Sie diese Medikamente noch am Morgen des Vortages, danach nicht mehr – es kann sonst zu vermehrten Blutungen kommen.
- Haben sie Diabetes?  
Nehmen Sie Metformin ein?  
Dann sollte es 2 Tage vor und 2 Tage nach dem Eingriff abgesetzt werden. Es kann zu Wechselwirkungen mit dem Kontrastmittel kommen.
- Alle anderen Medikamente wie ASS, Clopidogrel, Blutdrucksenker sollten Sie auch am Tag des Eingriffs einnehmen.